Pejnery blanc

Vass7R02s341-345

STROLL SAME Collection Vassal-Montpellier

Collection Vassal-Montpellier

TOTAL SAME COLLECTION Vassal-Montpellier

Pegnery blanc 7 R2 s 341.345



dintuduotedootuduotud





ANNEE 1990 NOM Pegnery blanc EMPLACEMENT 7 R20.341.345

1 3			N									
Souche	Nbre yeux	Débou début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	mi/f		t.	raison mi/v		Maturité
			5.3. 5.3.									
Po	urritu	re:		Mill.	0	Port :	10	rige	1	Vigue	ir : 2	5

NOM Regnery blane IMPLACEMENT 7 R 2 s 341. 345

	, r-								
ouche Nbre	Débourrement début mi/dél	Nbre grap	Parti- luté _i	Floraison	film	Véi début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 4 3 3 4 5 D	In 1	0 0 0	Crappe Four: Baie: Couleur	: G - M - P Mil TG - G - M disc-sph-el r : 8-Gr-Rs- : s - m - a : avec - ap	Dim 1 : - P D 1-ov- Rg-N r - f yrène	im : cbov-cy Jus ox - he	Compact yl-fus : inc	ité:	L - M -C

ANNEE 1992 MOM

Pegnery Clane EMPLACEMENT 4 R 2 1 341, 345

Souche N	Nbre	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	aison mi/f	fin	Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
2 3 4 5	2 2 2 2	153 23.3 193		0 0 0	Grappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Pépins Port:	TG - 0 disc-s r : B-0	Mil G - M Sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P <u>D</u> 1-ov- Rg-N r - fe	im : obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc		L - M -C

ANNEE:	1995 ynery	bl (ni)		EMPLAC	EMPLACEMENT 7 R2 x 341.345								
ouche Nbre		ni/déb		Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturit é		
1 1 2 2 3 3 4 2 5 5			0000	Couleu Saveur Pépins Port:	TG - (disc-s r : B-C : s - : avec	Mil 5 - M 5ph-el 5r-Rs- m - a c - ap	l : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im: obov-cy Jus ox - he	/l-fus : inc erb	- cc	L - M -C		

AMMEE: 1996 EMPLACMETERT . 4 R2 A 341 345 237.79.) in Véraison Whre Débourrement three yeux début mi/deb grap Floraison Fertilito debut mi/f fin debut mi/v fin Waturité 18,3 22,34 0 28,2 413 4 14.3 18.3 10 Grappo: G - M - P Dim: Compacité: L - H- C 4.3 11.3. 0 Four: Mill: paie: TG - G - H - P Dim: 4.3 18.3. 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré De 18.3 36 (+2) Saveur : s - m - ar - fox - herb Púpins r avec - apyrène Vigueur : Fort :

AMMEET: 1997
HOM Pejnery blanc EMPLANTERT 4R21341.345

44

Juntanlanti

iche	Whre youx	Débourr men! début mi/deb		Ferti-	Elova debut m			mi/v	Fin Watur 116
1 2 3 4 5	3 2 H H 107L		00000	Coulon Saveur	TC = G - disc-sph r : B-Gr	Mill: - M - F -ell-ov -Rs-Rg-	Dim: r-obov-cyl N dus: - fox - he	-fus fue -	ité: h = c

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

= 3596 Paineri

Année : 2006

Code cépage: OMtp865 Code introduction:

Nom introduction:

Observateur:

Sexe_

Emplacement: 7R21341-345

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal.

					\(\frac{1}{2}\)	the UVIC
	Nombre de	Date de	débourrement	Nbre grappes	Fertilité	1/06/0
Souche	bourgeons	début	moitié (oiv 301)	(oiv 153)	(grappes/10 yeux)	1
1	quyst			(AGRO)	1 1	5
2				0	Commence of	Becher
3		*		1 graphlano	Austonia corre	
4.	-			0		
5				0		
Moyenne						

Date de	floraison	Taux de	Date de	véraison	Date de	Début
début	moitié	nouaison	début	moitié	maturité	aoûtement
	(oiv 302)	% (oiv 501)		(oiv 303)	(oiv 304)	(oiv 306)

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Régnery blane 7-R23341-345 (3.345)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 82 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 276 - sans villosité laineuse 269.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 96 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 188 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duvereuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 200 - sans villosité laineuse 200.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 110 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 110 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Yace inférieure

dervures: glabre 11 séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - dureteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 26 sans villosité laineuse 2

la couleur de la 29me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

Timbe: glabre 200 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente 284 - sans vill@sité laineuse 285.

A limbe pan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 23).

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Tota (ement - sillon - partiellement.

Calvo 87

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement:

Regnery blane 7R2s-341-345 (5.5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 268 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dcs coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

. Calvo88

Rejnery blanc 7R2s-341.3454-3 N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 1(44) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

nluntandontoninganulustuul

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 partiellement - totalement.

Calvo 89

nlawiandmanadawandasiwal

Lejnery blanc 7 R 2 s - 344-345 s . 3

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1)/- elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils Surface massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - efface (2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calve 90

N° d'ordre : Désignation : Permery blane Emplacement : 7 k 2 1 341.345

Angle des nervures Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L1 L2/L : 10 - (11)Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - 37 - (38) 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües